

DE

Ergänzungsfuttermittel für Masthühner und Junghennen.

Anwendungshinweis: Die empfohlene Anwendung ist eine Tablette auf 1000 Liter Wasser, um eine Konzentration von 5E+8 KBE *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 pro Liter zu erhalten (Masthühner und Junghennen). Bei der Verarbeitung sind die Informationen des Sicherheitsdatenblattes und Hinweise der Produktinformation zu beachten. Nur für den gewerblichen Verwender. Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist. • **Lagerung:** In der original verschlossenen Verpackung, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen Ort bis zu 25 °C lagern. Nach dem Öffnen, den Beutel gut geschlossen halten. • **Zusammensetzung:** Natriumcarbonat, Natriumchlorid, Salze von Fettsäuren (Stearinsäure); **Zusatzstoffe** (pro 100 g): Citronensäure (1a330) 45 g, Darmflorastabilisatoren: *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 (4b1822): min. 3,8 E12 KBE. • **Analytische Bestandteile:** Rohprotein: 4,3 %; Rohfaser: 2,1 %; Roh Fett: 2,1 %; Rohasche: 41,6 %; Methionin: 0 %; Lysin: 0 %; Natrium: 15,6 %.

Enthält Zitronensäure. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren.

GB

Supplementary feed for broiler chickens and pullets.

Indications for use: The recommended application is one tablet per 1000 litres of water to obtain a concentration of 5E+8 CFU of *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 per litre (broiler chickens and pullets). During processing, the information on the safety data sheet and information on the product information must be observed. For commercial users only. The concomitant use of different organic acids or their salts is contraindicated if the maximum permissible level is reached or almost reached for one or more of them. • **Storage:** Store in the original sealed packaging, away from direct sunlight, in a dry place up to 25 °C. After opening, keep the bag tightly closed. • **Composition:** sodium carbonate, sodium chloride, salts of fatty acids (stearic acid); Additives (per 100 g): citric acid (1a330) 45 g, intestinal flora stabilizers: *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 (4b1822): min. 3.8 E12 CFU. • **Analytical constituents:** crude protein: 4.3%; Crude fibre: 2.1%; Raw fat: 2.1%; Crude ash: 41.6 %; Methionine: 0%; Lysine: 0%; Sodium: 15.6%.

Contains citric acid. Causes severe eye irritation. May irritate the respiratory tract. Avoid inhalation of dust/smoke/gas/mist/vapour/aerosol. After use, wash the face, hands and all exposed areas of skin thoroughly. IN CASE OF CONTACT WITH EYES: Rinse gently with water for a few minutes. Remove any contact lenses if possible. Continue to rinse. If eye irritation persists: Seek medical advice/medical help. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store under lock and key.

ES

Alimento complementario para pollos de engorde y pollitas.

Instrucciones de uso: La aplicación recomendada es de un comprimido por cada 1000 litros de agua para obtener una concentración de 5×10^8 UFC de *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 por litro (pollos de engorde y pollitas). Durante el procesamiento, se debe observar la información de la hoja de datos de seguridad y la información sobre el producto. Solo para usuarios comerciales. El uso concomitante de diferentes ácidos orgánicos o sus sales está contraindicado si se alcanza o casi se alcanza el nivel máximo permisible para uno o más de ellos. • Almacenamiento: Almacenar en el embalaje original sellado, lejos de la luz solar directa, en un lugar seco hasta 25 °C. Después de abrirla, mantenga la bolsa bien cerrada. • Composición: carbonato de sodio, cloruro de sodio, sales de ácidos grasos (ácido esteárico); Aditivos (por 100 g): ácido cítrico (1a330) 45 g, estabilizadores de la flora intestinal: *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 (4b1822): min. 3,8 E12 UFC. • Componentes analíticos: proteína bruta: 4,3%; Fibra bruta: 2,1%; Grasas brutas: 2,1%; Ceniza bruta: 41,6 %; Metionina: 0%; Lisina: 0%; Sodio: 15,6%.

Contiene ácido cítrico. Causa irritación ocular severa. Puede irritar las vías respiratorias. Evite la inhalación de polvo/humo/gas/niebla/vapor/aerosol. Después de su uso, lávese bien la cara, las manos y todas las áreas expuestas de la piel. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar suavemente con agua durante unos minutos. Quítese los lentes de contacto si es posible. Continúe enjuagando. Si la irritación ocular persiste: Busque consejo médico/ayuda médica. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente bien cerrado. Almacenar bajo llave.

FR

Aliment d'appoint pour les poulets de chair et les poulettes.

Conseils d'utilisation : L'application recommandée est d'un comprimé pour 1000 litres d'eau afin d'obtenir une concentration de 5×10^8 UFC de *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 par litre (poulets de chair et poulettes). Pendant le traitement, les informations sur la fiche de données de sécurité et les informations sur le produit doivent être respectées. Pour les utilisateurs commerciaux uniquement. L'utilisation concomitante de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée si la teneur maximale admissible est atteinte ou presque atteinte pour un ou plusieurs d'entre eux. • Stockage : Conserver dans l'emballage d'origine scellé, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec jusqu'à 25 °C. Après ouverture, gardez le sac bien fermé. • Composition : carbonate de sodium, chlorure de sodium, sels d'acides gras (acide stéarique) ; Additifs (pour 100 g) : acide citrique (1a330) 45 g, stabilisants de la flore intestinale : *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 (4b1822) : min. 3,8 E12 UFC. • Constituants analytiques : protéines brutes : 4,3 % ; Fibres brutes : 2,1 % ; Matières grasses brutes : 2,1 % ; Cendres brutes : 41,6 % ; Méthionine : 0 % ; Lysine : 0 % ; Sodium : 15,6 %.

Contient de l'acide citrique. Provoque une irritation oculaire sévère. Peut irriter les voies respiratoires. Évitez d'inhaler de la poussière, de la fumée, des gaz, des brouillards, des vapeurs ou des aérosols. Après utilisation, lavez soigneusement le visage, les mains et toutes les zones exposées de la peau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer doucement à l'eau pendant quelques minutes. Retirez toutes les lentilles de contact si possible. Continuez à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Demandez un avis médical. Stocker dans un endroit bien ventilé. Gardez le récipient bien fermé. Ranger sous clé.

IT

Mangime complementare per polli da carne e pollastre.

Indicazioni per l'uso: L'applicazione consigliata è di una compressa ogni 1000 litri di acqua per ottenere una concentrazione di $5E+8$ CFU di *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 per litro (polli da carne e pollastre). Durante la lavorazione, è necessario osservare le informazioni sulla scheda di dati di sicurezza e le informazioni sulle informazioni sul prodotto. Solo per utenti commerciali. L'uso concomitante di diversi acidi organici o dei loro sali è controindicato se per uno o più di essi si raggiunge o si sta quasi raggiungendo il livello massimo consentito. •

Conservazione: Conservare nella confezione originale sigillata, al riparo dalla luce diretta del sole, in un luogo asciutto fino a 25 °C. Dopo l'apertura, tenere il sacchetto ben chiuso. •

Composizione: carbonato di sodio, cloruro di sodio, sali di acidi grassi (acido stearico); Additivi (per 100 g): acido citrico (1a330) 45 g, stabilizzanti della flora intestinale: *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 (4b1822): min. 3,8 E12 CFU. • **Componenti analitici:** proteina grezza: 4,3%; Fibra grezza: 2,1%; Grassi grezzi: 2,1%; Ceneri grezze: 41,6 %; Metionina: 0%; Lisina: 0%; Sodio: 15,6%.

Contiene acido citrico. Provoca grave irritazione agli occhi. Può irritare le vie respiratorie.

Evitare l'inalazione di polvere/fumo/gas/nebbia/vapore/aerosol. Dopo l'uso, lavare accuratamente il viso, le mani e tutte le aree esposte della pelle. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare delicatamente con acqua per qualche minuto. Se possibile, rimuovere le lenti a contatto. Continuare a risciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico. Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare sotto chiave.

NL

Aanvullend diervoeder voor vleeskuikens en hennen.

Gebruiksaanwijzingen: De aanbevolen toepassing is één tablet per 1000 liter water om een concentratie van $5E+8$ CFU *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 per liter (vleeskuikens en jonge hennen) te verkrijgen. Tijdens de verwerking moeten de informatie op het veiligheidsinformatieblad en de informatie op de productinformatie in acht worden genomen. Alleen voor commerciële gebruikers. Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd als het maximaal toelaatbare niveau voor een of meer daarvan wordt bereikt of bijna bereikt. • **Opslag:** Bewaren in de originele verzegelde verpakking, uit de buurt van direct zonlicht, op een droge plaats tot 25 °C. Houd de zak na opening goed gesloten. • **Samenstelling:** natriumcarbonaat, natriumchloride, zouten van vetzuren (stearinezuur); Toevoegingsmiddelen (per 100 g): citroenzuur (1a330) 45 g, stabilisatoren voor de darmflora: *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 (4b1822): min. 3,8 kve. • **Analytische bestanddelen:** ruw eiwit: 4,3%; Ruwe celstof: 2,1%; Ruw vet: 2,1%; Ruwe as: 41,6 %; Methionine: 0%; Lysine: 0%; Natrium: 15,6%.

Bevat citroenzuur. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan de luchtwegen irriteren. Vermijd het inademen van stof/rook/gas/nevel/damp/aërosol. Was na gebruik het gezicht, de handen en alle blootgestelde delen van de huid grondig. **IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN:** Spoel voorzichtig af met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Blijf spoelen. Als de oogirritatie aanhoudt: Zoek medisch advies/medische hulp. Bewaren op een goed geventileerde plaats. Houd de verpakking goed gesloten. Opbergen achter slot en grendel.

DK

Tilskudsfoder til slagtekyllinger og høns.

Indikationer for brug: Den anbefalede anvendelse er en tablet pr. 1000 liter vand for at opnå en koncentration på $5E+8$ CFU af *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 pr. liter (slagtekyllinger og hønsekyllinger). Under behandlingen skal oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og oplysningerne i produktinformationen overholdes. Kun for kommercielle brugere. Samtidig brug af forskellige organiske syrer eller salte heraf er kontraindiceret, hvis det maksimalt tilladte niveau er nået eller næsten nået for en eller flere af dem. • Opbevaring: Opbevares i den originale forseglede emballage, væk fra direkte sollys, på et tørt sted op til 25 °C. Efter åbning skal posen holdes tæt lukket. • Sammensætning: natriumcarbonat, natriumchlorid, salte af fedtsyrer (stearinsyre); Tilsætningsstoffer (pr. 100 g): citronsyre (1a330) 45 g, tarmflorastabilisatorer: *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 (4b1822): min. $3,8 E12$ CFU. • Analytiske bestanddele: råprotein: 4,3%; Råfibre: 2,1 % Råfedt: 2,1%; Råaske: 41,6 % Methionin: 0%; Lysin: 0%; Natrium: 15,6 %.

Indeholder citronsyre. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan irritere luftvejene. Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/damp/aerosol. Efter brug skal du vaske ansigt, hænder og alle udsatte hudområder grundigt. I TILFÆLDE AF KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i et par minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Hvis øjenirritation fortsætter: Søg lægehjælp/lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares under lås og nøgle.

SE

Kompletteringsfoder för slaktkycklingar och unghöns.

Indikationer för användning: Den rekommenderade appliceringen är en tablett per 1000 liter vatten för att erhålla en koncentration på $5E+8$ CFU av *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 per liter (slaktkycklingar och unghöns). Vid bearbetningen måste informationen i säkerhetsdatabladet och informationen om produktinformationen följas. Endast för kommersiella användare. Samtidig användning av olika organiska syror eller deras salter är kontraindicerad om den högsta tillåtna nivån uppnås eller nästan uppnås för en eller flera av dem. • Förvaring: Förvaras i förseglad originalförpackning, ej i direkt solljus, på en torr plats upp till 25 °C. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten efter öppnandet. • Sammansättning: natriumkarbonat, natriumklorid, salter av fettsyror (stearinsyra); Tillsatser (per 100 g): citronsyra (1a330) 45 g, stabiliseringsmedel för tarmfloran: *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 (4b1822): minst $3,8 E12$ CFU. • Analytiska beståndsdelar: råprotein: 4,3%; Råfiber: 2,1 %; Råfett: 2,1%; Råaska: 41,6 %; Metionin: 0%; lysin: 0%; Natrium: 15,6 %.

Innehåller citronsyra. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan irritera luftvägarna. Undvik inandning av damm/rök/gas/dimma/ånga/aerosol. Efter användning, tvätta ansiktet, händerna och alla exponerade hudområden noggrant. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i några minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om möjligt. Fortsätt att skölja. Om ögonirritation kvarstår: Sök medicinsk rådgivning/medicinsk hjälp. Förvara på en väl ventilerad plats. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras bakom lås och bom.

PO

Alimentos suplementares para frangos de carne e frangas.

Indicações de uso: A aplicação recomendada é de um comprimido por 1000 litros de água para obter uma concentração de $5E+8$ UFC de *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 por litro (frangos de corte e frangas). Durante o processamento, devem ser respeitadas as informações constantes da ficha de dados de segurança e as informações sobre o medicamento. Apenas para utilizadores comerciais. A utilização concomitante de diferentes ácidos orgânicos ou dos seus sais é contraindicada se o teor máximo admissível for atingido ou quase atingido para um ou mais deles. • Armazenamento: Conservar na embalagem original selada, longe da luz solar

direta, em local seco até 25 °C. Após a abertura, manter o saco bem fechado. • Composição: carbonato de sódio, cloreto de sódio, sais de ácidos gordos (ácido esteárico); Aditivos (por 100 g): ácido cítrico (1a330) 45 g, estabilizadores da flora intestinal: Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (4b1822): min. 3,8 E12 UFC. • Constituintes analíticos: proteína bruta: 4,3%; Fibra bruta: 2,1%; Gordura bruta: 2,1%; Cinzas brutas: 41,6 %; Metionina: 0%; Lisina: 0%; Sódio: 15,6%.

Contém ácido cítrico. Provoca irritação ocular grave. Pode irritar o trato respiratório. Evitar a inalação de poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Após o uso, lave bem o rosto, as mãos e todas as áreas expostas da pele. EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar suavemente com água durante alguns minutos. Se possível, retire as lentes de contacto.

Continue a enxaguar. Se a irritação ocular persistir: Procure aconselhamento médico/ajuda médica. Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar a sete chaves.

RO

Hrană suplimentară pentru pui de carne și puicuțe.

Indicații de utilizare: Aplicarea recomandată este de un comprimat la 1000 litri de apă pentru a obține o concentrație de 5E+8 UFC de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 pe litru (pui de carne și puicuțe). În timpul prelucrării, trebuie respectate informațiile din fișa cu date de securitate și informațiile privind produsul. Numai pentru utilizatorii comerciali. Utilizarea concomitentă a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată dacă nivelul maxim admis este atins sau aproape atins pentru unul sau mai mulți dintre ei. •

Depozitare: A se păstra în ambalajul original sigilat, ferit de lumina directă a soarelui, într-un loc uscat până la 25 °C. După deschidere, păstrați punga bine închisă. • **Compoziție:** carbonat de sodiu, clorură de sodiu, săruri de acizi grași (acid stearic); Aditivi (la 100 g): acid citric (1a330) 45 g, stabilizatori ai florei intestinale: Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (4b1822): min. 3,8 E12 UFC. • **Constituenți analitici:** proteină brută: 4,3%; Fibră brută: 2,1%; Grăsimi brute: 2,1%; Cenușă brută: 41,6 %; Metionină: 0%; Lizină: 0%; Sodiu: 15,6%.

Conține acid citric. Provoacă iritații severe ale ochilor. Poate irita căile respiratorii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/aerosolilor. După utilizare, spălați bine fața, mâinile și toate zonele expuse ale pielii. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți ușor cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați orice lentile de contact, dacă este posibil. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: Solicitați sfatul medicului/ajutor medical. A se păstra într-un loc bine ventilat. Păstrați recipientul bine închis. A se păstra sub cheie.

PL

Karma uzupełniająca dla kurcząt brojlerów i młodych kur.

Wskazania do stosowania: Zalecane stosowanie to jedna tabletka na 1000 litrów wody w celu uzyskania stężenia 5E+8 CFU Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 na litr (brojlery i młode).

Podczas przetwarzania należy przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki oraz informacji o produkcie. Tylko dla użytkowników komercyjnych. Jednoczesne stosowanie różnych kwasów organicznych lub ich soli jest przeciwwskazane, jeśli maksymalny dopuszczalny poziom został osiągnięty lub prawie osiągnięty dla jednego lub więcej z nich. •

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w suchym miejscu w temperaturze do 25 °C. Po otwarciu torebkę należy szczelnie zamknąć. • **Skład:** węglan sodu, chlorek sodu, sole kwasów tłuszczowych (kwas stearynowy); Dodatki (na 100 g): kwas cytrynowy (1a330) 45 g, stabilizatory flory jelitowej: Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (4b1822): min. 3,8 E12 CFU. • **Składniki analityczne:** białko surowe: 4,3%; Włókno surowe: 2,1%; Tłuszcz surowy: 2,1%; Popiół surowy: 41,6 %; Metionina: 0%; Lizyna: 0%; Sód: 15,6%.

Zawiera kwas cytrynowy. Powoduje silne podrażnienie oczu. Może działać drażniąco na drogi oddechowe. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/aerozolu. Po użyciu dokładnie umyć twarz, ręce i wszystkie odsłonięte obszary skóry. W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Płukać delikatnie wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, należy zdjąć soczewki kontaktowe. Kontynuuj płukanie. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć porady lekarza/pomocy medycznej. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać pod kluczem i zamknięciem.

CZ

Doplňkové krmivo pro brojlerová kuřata a kuřice.

Indikace pro použití: Doporučená aplikace je jedna tableta na 1000 litrů vody k dosažení koncentrace 5E+8 CFU *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 na litr (brojlerová kuřata a kuřice). Při zpracování je třeba dodržovat informace uvedené v bezpečnostním listu a informace v informacích o přípravku. Pouze pro komerční uživatele. Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud je u jedné nebo více z nich dosaženo nebo téměř dosaženo maximální přípustné úrovně. • Skladování: Skladujte v původním uzavřeném obalu, mimo dosah přímého slunečního záření, na suchém místě do 25 °C. Po otevření uchovávejte sáček těsně uzavřený. • Složení: uhličitán sodný, chlorid sodný, soli mastných kyselin (kyselina stearová); Doplnkové látky (na 100 g): kyselina citronová (1a330) 45 g, stabilizátory střevní flóry: *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 (4b1822): min. 3,8 E12 CFU. • Analytické složky: hrubý protein: 4,3 %; hrubá vláknina: 2,1 %; Hrubý tuk: 2,1%; hrubý popel: 41,6 %; methionin: 0%; Lysin: 0%; Sodík: 15,6 %.

Obsahuje kyselinu citronovou. Způsobuje silné podráždění očí. Může dráždit dýchací cesty. Zabraňte vdechování prachu/kouře/plynu/mlhy/páry/aerosolu. Po použití důkladně umyjte obličej, ruce a všechny exponované oblasti pokožky. V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Jemně vyplachujte vodou po dobu několika minut. Pokud je to možné, vyjměte všechny kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte pod zámkem.

HU

Kiegészítő takarmány brojlercsirkék és csirkék számára.

Használati jelzések: Az ajánlott alkalmazás egy tablettát 1000 liter vízben, hogy 5E+8 CFU koncentrációt kapjunk a *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 literenként (brojlercsirkék és jércék). A feldolgozás során be kell tartani a biztonsági adatlapon és a terméktájékoztatóban szereplő információkat. Kizárólag kereskedelmi felhasználók számára. Különböző szerves savak vagy sóik egyidejű használata ellenjavallt, ha egy vagy több szerves sav esetében eléri vagy majdnem eléri a megengedett maximális szintet. • Tárolás: Tárolja eredeti, lezárt csomagolásban, közvetlen napfénytől védve, száraz helyen, legfeljebb 25 °C-ig. Felbontás után tartsa a zsákot szorosan lezárva. • Összetétel: nátrium-karbonát, nátrium-klorid, zsírsavak sói (sztearinsav); Adalékanyagok (100 g-onként): citromsav (1a330) 45 g, bélflóra stabilizátorok: *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 (4b1822): min. 3,8 E12 CFU. • Analitikai összetevők: nyersfehérje: 4,3%; nyersrost: 2,1%; Nyers zsír: 2,1%; nyershamu: 41,6 %; Metionin: 0%; lizin: 0%; Nátrium: 15,6%.

Citromsavat tartalmaz. Súlyos szemirritációt okoz. Irritálhatja a légutakat. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőz/aeroszol belélegzését. Használat után alaposan mossa meg az arcot, a kezét és a bőr minden szabadon lévő területét. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatosan öblítse le vízzel néhány percig. Ha lehetséges, távolítsa el minden kontaktlencsét. Folytassa az öblítést. Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Forduljon orvoshoz. Jól szellőző helyen tárolandó. A tartály szorosan lezárva tartandó. Tárolja zár és kulcs alatt.

GR

Συμπληρωματική τροφή για κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και κοτόπουλα.

Ενδείξεις χρήσης: Η συνιστώμενη εφαρμογή είναι ένα δισκίο ανά 1000 λίτρα νερού για να επιτευχθεί συγκέντρωση $5E+8$ CFU *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 ανά λίτρο (κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και όρνιθες). Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, πρέπει να τηρούνται οι πληροφορίες του δελτίου δεδομένων ασφαλείας και οι πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες για το προϊόν. Μόνο για εμπορικούς χρήστες. Η ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών οργανικών οξέων ή των αλάτων τους αντενδείκνυται εάν επιτευχθεί ή σχεδόν επιτευχθεί το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο για ένα ή περισσότερα από αυτά. • Αποθήκευση: Φυλάσσετε στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε ξηρό μέρος έως 25 °C. Μετά το άνοιγμα, διατηρείτε τον σάκο ερμητικά κλειστό. • Σύνθεση: ανθρακικό νάτριο, χλωριούχο νάτριο, άλατα λιπαρών οξέων (στεατικό οξύ). Πρόσθετα (ανά 100 g): κιτρικό οξύ (1a330) 45 g, σταθεροποιητές εντερικής χλωρίδας: *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 (4b1822): τουλάχιστον 3,8 E12 CFU. • Αναλυτικά συστατικά: ακατέργαστες πρωτεΐνες: 4,3%. Ολικές ινώδεις ουσίες: 2,1%· Ακατέργαστο λίπος: 2,1%; Ολική τέφρα: 41,6 %; Μεθειονίνη: 0%; Λυσίνη: 0%; Νάτριο: 15,6%.

Περιέχει κιτρικό οξύ. Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών. Μπορεί να ερεθίσει την αναπνευστική οδό. Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης/καπνού/αερίου/σταγονιδίων/ατμών/αερολύματος. Μετά τη χρήση, πλύνετε καλά το πρόσωπο, τα χέρια και όλες τις εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε απαλά με νερό για λίγα λεπτά. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής, εάν είναι δυνατόν. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει: Ζητήστε ιατρική συμβουλή / ιατρική βοήθεια. Φυλάσσετε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό. Φυλάσσετε με κλειδαριά και κλειδί.